





# ການໃຊ້ສານກຳຈັດສັດຕູພືດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

-  ໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ
-  ອາກາດທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການສີດ
-  ຫົວສີດດີ ແລະ ສະອາດ
-  ທຳຄວາມສະອາດຫຼັງສີດພື້ນ

## ປະເພດແມງໄມ້



1 ເພັຍອ່ອນ 2 ແມງຫວີຂາວ 3 ບັງແມງກະບີ 4 ຫນອນຊ້ອນໃບຈາກແມງກະບີ 5 ຫນອນຊ້ອນໃບຈາກແມງວັນ 6 ໂຮແດງ

ສານອອກລິດ	ກຸ່ມສານເຄມີ	ການອອກລິດ	1 / 2	3 / 4	5	6
ຟີໂຟຣນິລ	2B	SC	☺		☺	
ແລມບໍາ ໄຊຣາໂລທຣິນ	3A	SC	☺	☺	☺	☺
ໄດໂນທິຟູແຣນ	4A	S	☺		☺	
ໄທອະມິໂທແຊມ	4A	S	☺			
ອີມິດາຄາຣິດ	4A	S	☺			
ສະປິນໂນແຊລ	5	S		☺	☺	
ອະບາເມ ກາຕິນ	6	SC (ດູດຊີມເລັກນ້ອຍ)		☺	☺	☺
ໄທໂອໄຊແຄລມ ອອກຊາເລດ	14	SC	☺		☺	
ຄໍແລນທານິລີໂຟນ	28	S		☺		
ຟລູເບນໄດອະໄມ	28	S		☺		

ກົນໄກການອອກລິດ, sc (ປະເພດກົນຕາຍ+ສຳຜັດ), s (ປະເພດດູດຊີມ)



- » ສຳລັບກຸ່ມສານເຄມີເພື່ອປ້ອງກັນການຕີຢາ
- » ຄວບຄຸມແມງໄມ້ປາກດູດ ເພື່ອປ້ອງກັນໄວຣັດ
- » ກຳຈັດຕົ້ນ ຫຼື ຫມາກທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ
- » ຫຼັງຍ່າຍປູກ 60ວັນ ຫາກພ ບວ່າພືດແຂງແຮງດີ ໃຫ້ທດການສີດພໍ່ນສານເຄມີ
- » ພະຍາດງ່ຽວແບກທິເຣຍ ແລະ ພະຍາດຫງວຣາເມັດຜັກກາດ ຕ້ອງຄວບຄຸມໂດຍການເຂດຕະກຳ



ສານອອກລິດ	ກ ນໄກການອອກ	ກຸ່ມພະຍາດພືດເປົ້າຫມາຍ	ຫມາຍເຫດ
ຄໍໂຣທາໂລນິນ	ປ້ອງກັນ	ຄວບຄຸມກວ້າງ	
ແມນໂຄເຊບ	ປ້ອງກັນ	ຄວບຄຸມກວ້າງ	
ອະຊອກຊີສິນໂຕຣບິນ	ປ້ອງກັນ+ຮັກສາ	ໃບໄຫມ	ສູງສຸດ 4 ຄັ້ງຕໍ່ຮອບການປູກ
ໄພຟາໂມຄາຣບ	ປ້ອງກັນ+ຮັກສາ	ໃບຈຸດ-ໄຫມ້	
ໄອໂຟໂຕອອນ	ການຮັກສາ	ໃບຈຸດ-ໄຫມ້	ຜະສົມກັບສານປ້ອງກັນໄດ້ (ຄໍໂຣທາໂຣນິລ ຫຼື ແມນໂຄເຊບ)
ເມທາແລກຊິລ	ປ້ອງກັນ+ຮັກສາ	ໃບຈຸດ-ໄຫມ້	ງ່າຍຕໍ່ການຕີຢາ (ໃຊ້ພຽງ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ຮອບການປູກ

## ປະເພດຂອງພະຍາດພືດ



ຫງວແບກທິເຣຍ ໃບຈຸດ-ໄຫມ້ ໃບໄຫມ້ ໄວຣັດໃບດ່າງ ໄວຣັສໃບຫງົກ

<http://guides.eastwestseed.com>

ຄູ່ມືການປູກສະບັບນີ້ຜະລິດຂຶ້ນໂດຍມູນລະນິທິເວດສິດ@2017 ລິຄະສິດຂອງມູນລະນິທິ ອິດເວດສິດ ສະຫງວນລິຂະສິດ  
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research



Version 2018




# ຄູ່ມືການປູກໜາກເລັ່ນ

## ການກຽມໜານ

- » ຮ່ອງນ້ຳຊ່ວຍໃນເລື່ອງການໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ລະບາຍນ້ຳ
- » ປັກຄ່າງຫຼັງຍ້າຍປູກ 8-10 ວັນ
- » 4,260 ຕົ້ນ/ໄລ່



LAOS




# ການກັບເບ້ຍ


ການກຽມດິນກັບເບ້ຍ: ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ 10 ນາທີ ຫຼື ຕາກແດດປະມານເຄິ່ງວັນ ຈົ່ງນໍາໄປປັ້ນຈຸໄສ່ແຕະກັບເບ້ຍ




# ການຍອດເມັດ ແລະ ການບົວລະບົດຮັກສາເບ້ຍ




ຢອດເມັດພັນເລິກ 1/2 ຂອງຂະໜາດເມັດພັນ




# ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ




ຕອນເຊົ້າ ຕອນແລງ



ລຸດການໃຫ້ນໍ້າລົງ ແລະ ໃຫ້ເບ້ຍຜັກໄດ້ຮັບແສງແດດຫຼາຍຂຶ້ນ 2-3 ວັນ ກ່ອນຍ້າຍປູກ (ປູກໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດເຢັນ)



# ການໃສ່ປຸ້ຍ



ປະລິມານປຸ້ຍທີ່ແນະນໍາຂຶ້ນຢູ່ກັບປະຊາກອນພືດ 4,260 ຕົ້ນ/ໄລ່

# ວິທີເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ

ກໍາຈັດພືດທີ່ຕິດພະຍາດ ເສດຊາກພືດ ແລະ ວັດສະພືດອອກຈາກຫນານເພື່ອ ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ

